STUDIENANGEBOT DARMKREBSZENTRUM UND medius TUMORZENTRUM NÜRTINGEN

Stand Juni 2018

Kolorektale Karzinome:

Erbitag NIS

Nicht-interventionelle Studie zur Effizienz von Cetuximab (Erbitux®) in der Erstlinienbehandlung beim metastasierten kolorektalen Karzinom mit Wildtyp RAS Gen.

QoLiTrap NIS

Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom unter Aflibercept (Zaltrap®)-Therapie.

Fire-4

Randomisierten Phase III Studie zur Evaluation der Wirksamkeit einer Cetuximab-Reexposition bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom mit Wildtyp RAS Gen.

PARLIM

Randomisierte, open-label, multizentrische Phase II Studie.
Panitumumab nach Resektion von Lebermetastasen des kolorektalen Karzinoms bei Patienten mit RAS-Wildtyp.

VALIDATE

Nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Sicherheit und Effektivität der Erstlinientherapie mit Vectibix® in der Kombination mit Irinotecan, 5FU und Folinsäure und zur Validierung eines Prognose-Scores bei erwachsenen Patienten mit RAS-Wildtyp metastasiertem kolorektalem Karzinom unter Alltagsbedingungen.

Pankreaskarzinom:

CONKO-007

Randomisierte Phase III Studie zum Stellenwert einer Radiochemotherapie nach Induktionschemotherapie beim lokal begrenzten, inoperablen Pankreaskarzinom: Chemotherapie versus Radiochemotherapie.

QoliXane NIS

Erfassung der Lebensqualität, Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom unter Erstlinientherapie mit NabPaclitaxel (Abraxane®) und Gemcitabin.

Magen-/Ösophaguskarzinom:

AIO_YMO_0111 MATEO

Randomisierte, kontrollierte Studie zur Erhaltungstherapie bei metastasiertem Ösophagus- oder Magen-Karzinom: S-1 Deeskalation versus Fortsetzung der Chemotherapie.

B-Zell-Lyphom:

OPTIMAL>60

Randomisierte Phase III Studie zur Verbesserung der Therapieergebnisse und Verminderung der Nebenwirkungen bei älteren Patienten mit CD20+ aggressiven B-Zell-Lymphomen durch eine optimierte Gabe des monoklonalen Antikörpers Rituximab, Ersatz von konventionellem durch liposomales Vincristin und FDG-PET basierter Therapiereduktion.

Weitere Studien:

Chemotherapie bedingte Neutropenie

Accord NIS

Nicht-interventionelle Studie zur Effizienz der supportiven Therapie mit Filgastrim (Accofil®) während einer zytotoxischen Chemotherapie.

Thrombose bei malignen Erkrankungen

CONKO – 011 AIO-SUP-0115

Randomisierte Phase III Studie zum Stellenwert von Rivaroxaban (Xarelto®) zur Behandlung venöser Thrombosen bei Patienten mit aktiver maligner Erkrankung: Rivaroxaban versus niedermolekulares Heparin.

Registerstudien:

MZoL-Register

Registrierung aller Marginalzonen-Lymphome einschließlich Rezidive.

GIST (gastrointenstinale Stromatumore)

1. Multizentrische Studie zu GIST (MuzGi)
2. Untersuchung des Zusammenhangs von Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) und Neurofibromatose Typ1 (NF 1)

Okkultes Gallenblasenkarzinom

Zentralregister „Okkultes Gallenblasenkarzinom**“**

ColoPredict Plus

Multizentrisches nicht interventionelles Register für Patienten mit einem Kolonkarzinom im Stadium II und III. Beurteilung der Rolle einer MSI in Kombination mit einer KRAS-Mutation für die Prognose.